

gales. Les boutons, avant l'anthèse, se courbent vers la terre d'une manière remarquable; mais ils se redressent avant l'épanouissement. Les tubes des calices sont courts, presque globuleux, et glabres ainsi que les pédoncules et les divisions du limbe: ces mêmes divisions sont presque simples, aussi longues que les pétales, et dilatées en spatule au sommet. Les pétales sont échancrés en cœur, et d'un rose tendre. Le fruit est presque rond, et rouge à la maturité.

## OBSERVATIONS.

Le premier de ces Rosiers (celui à fleurs simples) est vraisemblablement un hybride issu d'un Rosier du Bengale et d'un Rosier des Alpes: il nous a été communiqué par M. CUCNOT; il est assez rare. Le second, qui se trouve communément dans les jardins, et qu'on connaît sous le nom de Rosier BOURSAULT, est un produit de la semence du premier. Tous deux se couvrent au printemps d'un grand nombre de fleurs qui persistent jusqu'à l'automne sur les pieds bien exposés. Ils n'exigent aucune culture.



*Rosa Reclinata* flore sub-multiplici.

*P. J. Redouté pinxit.*

*Rosier à boutons penchés.* (var. à fleurs semi doubles)

*Imprimaria de Perard.*

*Langlois sculp.*